

dUTP, 100mM Solution 产品说明书

产品信息

产品名称	Cat#	规格
dUTP，100mM Solution	N501A01	100 μL
	N501A02	200 μL
	N501A03	500 μL
	N501A04	1 mL


产品描述

dUTP 中文名为脱氧尿苷三磷酸，常用于 PCR 、qPCR、 RT-PCR 和 RT-qPCR 等反应中替代 dTTP，使扩增反应得到的产物中含有尿嘧啶。将尿嘧啶-N-糖基酶 UNG（也称为 UDG 酶）加入到扩增反应体系中，可切除任何污染扩增产物的尿嘧啶，从而避免假阳性的形成。本产品为溶液钠盐形式，用超纯水配制，浓度为 100 mM,经检测，dUTP 纯度≥99% (HPLC)，且无 DNase 和 RNase 污染。

本产品为即用型，可以直接用于 PCR 等各种常规分子生物学反应。

删除[瀚渺苍茫]: A

产品属性

CAS 号	54680-12-5
分子式	C ₉ H ₁₂ N ₂ Na ₃ O ₁₄ P ₃
分子量	534.09 g/mol
纯度	≥ 99%
浓度	100 ± 5mM
结构式	

运输和储存

本产品冰袋运输，可在-15℃~ -25℃保存两年。

注意事项

- ◆ 可以室温溶解，溶解后宜存放于冰盒内或冰浴上，使用完毕后宜立即置于-20℃ 保存。
- ◆ 本产品仅限科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- ◆ 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

常见问题与解决方案

Q1: PCR 反应中 dNTP 起作用是什么原理？

A1: dNTP 既是复制的原料，又为链延长的过程提供能量。在细胞内，DNA 的复制需要四种脱氧核糖核苷酸作为原料，而 PCR 技术扩增目的基因需要的原料却是 dNTP（dATP、dGTP、dCTP、dTTP）（脱氧核苷酸三磷酸）。实际上，在 PCR 技术中，DNA 复制时直接参与合成 DNA 的是四种脱氧核苷酸三磷酸（dATP、dGTP、dCTP、dTTP，统称为 dNTP），在 DNA 聚合酶催化作用下，引物或者已合成的 DNA 链的 3'—羟基对进入的脱氧核苷酸三磷酸 α —磷原子发生亲核攻击，从而形成 3', 5'—磷酸二酯键并脱下焦磷酸（PPi），形成磷酸二酯键所需要的能量来自 α —与 β —磷酸基之间高能磷酸键的裂解。

Q2: 这个产品可以用无菌水稀释吗，稀释后可以保存多久？

A2: 用无菌水稀释即可，稀释后能保存多久未尝试，建议越早用完越好。